diagnostics
with passion

sifin

Nährmedien für die Mikrobiologie

Trocken- und Fertignährmedien für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie sowie Veterinärmedizin

Lebensmittel | Pharma | Kosmetik | Veterinär

Nährmedien aus erster Hand

FÜR DIE LEBENSMITTEL-, PHARMA- UND KOSMETIKINDUSTRIE SOWIE VETERINÄRMEDIZIN



NEW

Wir produzieren Ihre Fertignährmedien.

Nährmedien aus erster Hand

Wir produzieren über 200 verschiedene Nährmedien bzw. Supplemente, mit denen Sie Mikroorganismen anzüchten oder das Wachstum besonders anspruchsvoller Spezies gezielt fördern können.

Damit sind Sie bestens für Ihre Untersuchungen von human- und veterinärmedizinischen Proben ausgestattet.

Haben Sie eine spezielle Anforderung? Oder möchten Sie die Herstellung eines Mediums nach Ihrer hauseigenen Rezeptur?

Wir entwickeln und produzieren für Sie nach Ihren Vorgaben.

Unser Portfolio umfasst:

- Trockennährmedien
- Supplemente und Zusätze
- Gebrauchsfertige Nährmedien
- Grundstoffe
- Nachweisreagenzien

sifin diagnostics gmbh
Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 700 144-0
Telefax: +49 30 700 144-30
E-Mail: info@sifin.dee

www.sifin.de

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Kontakt 4
Bestellformular 6
Zertifikat DIN EN ISO/IEC 17025 45

Trocken- und Fertignährmedien

Nährmedien für die Lebensmitteldiagnostik 7
Untersuchung von Milch, Milchprodukten und Speiseeis 8
Untersuchung von natürlichem Mineral-, Quell-, Tafelwasser 13
Wasser- und Abwasseruntersuchung 16
Untersuchung von Trinkwasser 19
Untersuchung von Lebensmitteln 21
Untersuchung von Fleisch und Fleischprodukten 26
Untersuchungen in der Getränkeindustrie 30
Nachweis anaerober Mikroorganismen 32
Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen 33
Biochemische Identifizierung 34

Nährmedien für die Pharmaindustrie 35

Nährmedien für die Kosmetikindustrie 39

Nährmedien für die Veterinärmedizin 41

Individuelle Fertignährmedien?
Produzieren wir gerne auf Anfrage!

Melden Sie Ihr Wunschprodukt
einfach unserem Vertriebsteam.



Datum der Fassung: 25/06/2026

Ihr Kontakt zu sifin

Sie erreichen uns persönlich

Montag bis Donnerstag	7:30 bis 16:15 Uhr
Freitag	7:30 bis 15:00 Uhr
Zentrale	Telefon: +49 30 700 144-0
	E-Mail: info@sifin.de
Kundenservice	Telefon: +49 30 700 144-298 oder
	+49 30 700 144-296
	E-Mail: vertrieb@sifin.de

Bestellung


Auftragsannahme	Telefon: +49 30 700 144-279
	Telefax: +49 30 700 144-30
	Telefon: 0800 700 144-0 (kostenfrei)
	Telefax: 0800 700 144-3 (kostenfrei)
	E-Mail: vertrieb@sifin.de

Service Außendienst
info@sifin.de

Gebietsleitung West	Mobil: +49 176 1232 7872
Gebietsleitung Ost	Mobil: +49 172 1656 325
Applikation	Mobil: +49 176 1232 7877

Nährmedien

MIKROBIOLOGIE



Culture media with quality - Made in Germany

Wir produzieren über 200 verschiedene Nährmedien und Supplemente, mit denen Sie Mikroorganismen anzüchten oder das Wachstum besonders anspruchsvoller Spezies gezielt fördern können. Damit sind Sie bestens ausgestattet für Ihre Untersuchungen von Lebensmitteln, Wasser, Arzneimitteln, von Proben aus Klinik, Hygiene und Umwelt nach den jeweiligen Gesetzen, Richtlinien und Normen.

Nährmedien für die verschiedensten Anwendungsgebiete und Fragestellungen

Medizinische Mikrobiologie

- Medien zur Anzüchtung und Keimzahlbestimmung
- Selektivnährmedien
- Medien zur Differenzierung
- Medien zur Empfindlichkeitstestung

Mikrobiologische Untersuchung von Trinkwasser

- Nährmedien zur Bestimmung der Koloniezahl
- Nährmedien zum Nachweis von: *E. coli*, *Enterococci*, *Clostridium perfringens*, *Pseudomonas aeruginosa*

Medien für die mikrobiologische Untersuchung in der Pharma- und Kosmetikindustrie

- Nährmedien für die Anreicherung und Anzüchtung
- Medien für die Sterilitätstestung
- Medien für die Qualitätskontrolle nicht steriler Produkte nach der harm. Methode nach EP, USP und JP

Spezielle Indikationen

- Umwelt
- Hygiene
- Fermentation

Chromogene Nährmedien

- Trockennährmedien

Pilzdiagnostik

- Pilze, Hefen, Dermatophyten
- Lebensmittel und anderes Untersuchungsmaterial
- Pharmazeutische Produkte nach harm. EP/USP/JP

Veterinärmedizinische Mikrobiologie

- Förderung der Ausbildung vom Fimbrien-Antigen F5 (K 99) in Rindern: Kultivierung auf Minca-Agar und Minca-Supplement
- Förderung der Ausbildung vom Fimbrien-Antigen F4 (K 88) in Ferkeln: Kultivierung z. B. auf Columbia-Blut-Agar bei Zugabe von Schafblut

Bestellformular

Fax 0800 700 144-3

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 700 144-0
Telefax: +49 30 700 144-30
E-Mail: info@sifin.de

Kunden-Nr.

Name

Artikel-Nummer	Menge	Bezeichnung

Rechnungsadresse

Firma / Abteilung

Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Lieferadresse

Firma / Abteilung

Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

☑ **Ich bestelle die oben genannten Produkte.**

Ort, Datum

Unterschrift

Nährmedien für die Lebensmitteldiagnostik

MIKROBIOLOGIE



NEW

Wir produzieren Ihre Fertignährmedien.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Nährmedien für die Untersuchung von Lebensmitteln.

Inhalt

- Untersuchung von Milch, Milchprodukten und Speiseeis
- Untersuchung von natürlichem Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser
- Wasser- und Abwasseruntersuchung
- Untersuchung von Trinkwasser
- Untersuchung von Lebensmitteln
- Untersuchung von Fleisch und Fleischprodukten
- Untersuchungen in der Getränkeindustrie
- Nachweis anaerober Mikroorganismen
- Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen
- Biochemische Identifizierung

NEW

Wir produzieren Ihre Fertignährmedien

✓ **Individuelle Fertignährmedien auf Wunsch lieferbar**
✓ **Erweitertes Sortiment auf Anfrage verfügbar**
✓ **Weitere Abpackungen erhältlich**



Untersuchung von Milch, Milchprodukten und Speiseeis

E. coli und coliforme Keime

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1109	**Brillantgrün-Galle-Lactose-Bouillon (BRILA-Bouillon)**	für 12,5 l Nährmedium: einfachkonzentriert (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 6,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (80,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1152	**Laurylsulfat-Bouillon (Laurylsulfat-Tryptose-Lactose-Bouillon)**	für 14,0 l Nährmedium (35,6 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1153	**Laurylsulfat-Tryptose-Bouillon mit Tryptophan und MUG (LST/MUG-Nährmedium)**	für 13,6 l Nährmedium: einfachkonztriert (36,7 g für 1 l Nährmedium) für 6,8 l Nährmedium: doppeltkonztriert (73,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Isolierung

TN1130	**Endo-Agar (Lactose-Fuchsin-Sulfit-Agar)**	für 14,5 l Nährmedium (34,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich	500 g
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1149	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose-Agar (VRB-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1148	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1156	**MacConkey-Agar**	für 10,3 l Nährmedium (48,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1075 TN1075-01	**MacConkey-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium) für 100,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1259	**TBX-Chromogen-Agar (Trypton-Galle-X-Glucuronid-Agar)**	für 15,8 l Nährmedium (31,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Salmonellen

Nichtselektive Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1137 TN1137-01	**Gepuffertes Peptonwasser**	für 25 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium) für 250 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Selektive Anreicherung

TN1157	**Magnesiumchlorid-Malachitgrün-Bouillon nach Rappaport und Vassiliadis (RV-Medium)**	für 15,0 l Nährmedium (33,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1262	**Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon nach harm. EP/USP/JP (RVS Bouillon)**	für 18,5 l Nährmedium (27,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1183	**Selenit-Cystin-Bouillon**	für 21,7 l Nährmedium (23,0 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1187	**Tetrathionat-Bouillon (Basis) nach Muller-Kauffmann**	für 5,0 l Nährmedium (89,4 g für 1 l Nährmedium) Jod-Kaliumjodid-Lösung (5 g Kaliumjodid, 4 g Jod, 20 ml Aqua dest.) zugeben.	500 g

Isolierung

TN1110	**Brillantgrün-Phenolrot-Agar nach Edel und Kampelmacher (BPLS-Agar, mod.)**	für 10,1 l Nährmedium (49,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1121	**Desoxycholat-Citrat-Agar, modifiziert (Leifson-Agar, DCLS-Agar, modifiziert)**	für 10,1 l Nährmedium (49,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1221 TN1221-01	**Salmonella-Shigella-Agar, modifiziert (SS-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium) für 88,5 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1194 TN1194-01	**Wasserblau-Metachromgelb-Agar nach Gassner, modifiziert (Gassner-Agar, modifiziert)**	für 9,9 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium) für 99,4 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1170	**XLD-Agar nach harm. EP/USP/JP (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 9,1 l Nährmedium (55,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1196	**XLD-Agar nach ISO 6579 (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (57,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Ablaufschema



Bestätigung

TN1308	**Harnstoff-Lösung, 40%**	Zusatz für Nährmedien: 1 Fl. in 1 l Kligler-Eisen-Agar TN1146.	12 x 1 Fl.
TN1146	**Kligler-Eisen-Agar (KIA, Eisen-Zweizucker-Agar nach Kligler)**	für 10,1 l Nährmedium (49,6 g für 1 l Nährmedium) Harnstoff-Lösung, 40% TN1308 ggf. zugeben.	500 g
TN1154	**Lysindecarboxylase-Bouillon (LDC-Bouillon)**	für 5,5 l Nährmedium (9,0 g für 1 l Nährmedium)	50 g
TN1272	**MSRV-Nährboden (Basis) (Modified-Semisolid-Rappaport-Vassiliadis-Medium)**	für 15,8 l Nährmedium (31,6 g für 1 l Nährmedium) Novobiocin-Selektiv-Supplement TN1324 zugeben.	500 g
TN1324	**Novobiocin-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l MSRV-Nährboden (Basis) TN1272.	12 x 1 Fl.

Koagulase-positive Staphylokokken

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1104	**Baird-Parker-Agar (Basis)**	für 7,9 l Nährmedium (63,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Kaliumtellurit TN1310 zugeben.	500 g
TN1310	**Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion**	für ca. 2 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Baird-Parker-Agar (Basis) TN 1104.	4 x 25 ml
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Hefen und Schimmelpilze

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Würze-Agar (Basis) TN 1210	100 ml
TN1264	**Sabouraud-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 7,7 l Nährmedium (65,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1178 TN1178-01	**Sabouraud-2%Glucose-Agar (Sabouraud-Dextrose-Agar)**	für 11,9 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium) für 119,0 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1746	**Würze-Agar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1210	**Würze-Agar (Basis)**	für 10,4 l Nährmedium (48,0 g für 1 l Nährmedium) Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1144	**YGC-Agar (Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar)**	für 14,2 l Nährmedium (35,1 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Säure- und nicht säurebildende Mikroorganismen

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1114	**Chinablau-Lactose-Agar**	für 13,0 l Nährmedium (38,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Clostridien

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1116	**Clostridien-Differential-Bouillon (DRCM)**	für 16,6 l Nährmedium: einfachkonzentriert (30,1 g für 1 l Nährmedium) für 8,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (60,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1167	**Clostridien-Medium nach harm. EP/USP/JP (RCM)**	für 13,2 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1188 TN1188-01	**Thioglycolat-Nährmedium nach EP/USP (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Listerien


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1257	**Fraser-Bouillon (Basis)**	für 8,7 l Nährmedium (57,4 g für 1 l Nährmedium) Fraser-Selektiv-Supplement TN 1318 zugeben.	500 g
TN1035	**Fraser-Bouillon, komplett**	für 8,6 l Nährmedium (57,9 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1034 TN1034-01	**Fraser-Bouillon - halbkonzentriert, komplett**	für 8,6 l Nährmedium (57,9 g für 1 l Nährmedium) für 86,3 l Nährmedium (57,9 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g 5 kg
TN1318	**Fraser-Selektiv-Supplement**	für 3 l Nährmedium (1 Fl. je Komponente für 0,5 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien besteht aus zwei Komponenten. 1 Fl. pro Komponente in 0,5 l Fraser-Bouillon (Basis) TN1257.	6 x 2 Fl.
TN1209	**Palcam-Agar (Basis) (Palcam-Agar nach van Netten)**	für 7,4 l Nährmedium (68,0 g für 1 l Nährmedium) Palcam-Selektiv-Supplement TN1312 zugeben.	500 g
TN1312	**Palcam-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Palcam-Agar (Basis) TN1209.	12 x 1 Fl.

Bacillus cereus

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1245	**Bacillus-Cereus-Agar (Basis) (PEMBA)**	für 12,5 l Nährmedium (39,9 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Emulsion TN1316 und Bacillus-Cereus-Selektiv-Supplement TN1315 zugeben.	500 g
TN1315	**Bacillus-Cereus-Selektiv-Supplement (Polymyxin B-Selektiv-Supplement)**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Mit Bacillus-Cereus-Agar (Basis) TN1245 und Eigelb-Emulsion TN1316.	12 x 1 Fl.
TN1316	**Eigelb-Emulsion**	für ca. 1-2 l Nährmedium (2-4 Fl. für ca. 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Bacillus-Cereus-Agar (Basis) TN1245. 4 Fl. in 900 ml MYP-Agar (Basis) TN1291.	4 x 25 ml
TN1291	**MYP-Agar (Basis) (Cereus-Selektivagar nach Mossel)**	für 11,6 l Nährmedium (43,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Emulsion TN 1316 und Bacillus-Cereus-Selektiv-Supplement TN1315 zugeben.	500 g

Beste Nährmedien-Qualität

Bioscreening mit sifin Nährmedien I Wettbewerbsvergleich



Bioscreen-Monitore zeigen das Wachstum von Mikroorganismen anhand von Dichtemessungen flüssiger Wachstumsmedien in Mikrotiterplatten. Aufgezeichnet werden die Messwerte der optischen Dichte zu verschiedenen Zeitpunkten.

Je idealer die Zusammensetzung des Nährmediums, desto schneller steigt die Zelldichte der Mikroorganismen

optische Dichte / h *)

x-Achse: Dauer in Stunden (h)
y-Achse: optische Dichte (OD)

– sifin diagnostics gmbh
– Mitbewerber 1
– Mitbewerber 2

*) mit Gepufferten Peptonwasser (BPW), TN1137

Untersuchung von natürlichem Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser

Keimzahlbestimmung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1124	**DEV Gelatine-Agar**	für 11,1 l Nährmedium (45,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1724	**DEV Nähragar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1128 TN1128-01	**DEV Nähragar**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1164 TN1164-01	**Nähragar I**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben.	500 g 5 kg
TN1189	**Plate-Count-Agar (TGE-Agar, Trypton-Glucose-Hefeextrakt-Agar)**	für 27,0 l Nährmedium (18,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

E. coli und coliforme Keime

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1109	**Brillantgrün-Galle-Lactose-Bouillon (BRILA-Bouillon)**	für 12,5 l Nährmedium: einfachkonzentriert (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 6,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (80,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1127 TN1127-01	**DEV Lactose-Pepton-Bouillon**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1152	**Laurylsulfat-Bouillon (Laurylsulfat-Tryptose-Lactose-Bouillon)**	für 14,0 l Nährmedium (35,6 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1153	**Laurylsulfat-Tryptose-Bouillon mit Tryptophan und MUG (LST/MUG-Nährmedium)**	für 13,6 l Nährmedium: einfachkonztriert (36,7 g für 1 l Nährmedium) für 6,8 l Nährmedium: doppeltkonztriert (73,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Isolierung

TN1130	**Endo-Agar (Lactose-Fuchsin-Sulfit-Agar)**	für 14,5 l Nährmedium (34,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1156	**MacConkey-Agar**	für 10,3 l Nährmedium (48,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1075 TN1075-01	**MacConkey-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium) für 100,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1259	**TBX-Chromogen-Agar (Trypton-Galle-X-Glucuronid-Agar)**	für 15,8 l Nährmedium (31,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Bestätigung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1517	**Oxidase-Reagenz**	für 12 Anwendungen 1 Fl. in 2 ml Aqua dest. lösen.	12 x 1 Fl.
TN1258	**Tryptophan-Peptonwasser (Tryptophan-Bouillon)**	für 6,3 l Nährmedium (16,0 g für 1 l Nährmedium)	100 g

Fäkalstreptokokken

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1103	**Azid-Glucose-Bouillon**	für 14,3 l Nährmedium: einfachkonzentriert (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 7,4 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (70,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Isolierung

TN1132	**Enterokokken-Selektiv-Agar nach Slanetz-Bartley (m-Enterokokkus-Agar)**	für 12,0 l Nährmedium (41,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1217	**Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar (KAA-Agar)**	für 11,7 l Nährmedium (42,7 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Bestätigung

TN1276	**Galle-Äsculin-Azid-Agar (GÄA-Agar)**	für 9,3 l Nährmedium (53,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1216	**Hirn-Herz-Bouillon (BHI)**	für 13,5 l Nährmedium (37,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Pseudomonas aeruginosa

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1158	**Malachitgrün-Bouillon**	für 56,8 l Nährmedium (8,8 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Isolierung

TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286	100 ml
TN1517	**Oxidase-Reagenz**	für 12 Anwendungen 1 Fl. in 2 ml Aqua dest. lösen.	12 x 1 Fl.
TN1286	**Pseudomonas-Agar (Basis)**	für 10,3 l Nährmedium (48,4 g für 1 l Nährmedium) Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement TN1323 und Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1323	**Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286.	12 x 1 Fl.

Sulfitreduzierende, sporenbildende Anaerobier

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1116	**Clostridien-Differential-Bouillon (DRCM)**	für 16,6 l Nährmedium: einfachkonzentriert (30,1 g für 1 l Medium) für 8,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (60,2 g für 1 l Medium)	500 g
TN1167	**Clostridien-Medium nach harm. EP/USP/JP (RCM)**	für 13,2 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Bestätigung

TN1288	**m-CP-Agar (Basis) (Chromogener Membranfiltrations-Clostridium perfringens-Agar)**	für 7,3 l Nährmedium (68,2 g für 1 l Nährmedium) m-CP-Selektiv-Supplement TN1330 zugeben.	500 g
TN1330	**m-CP-Selektiv-Supplement**	für 2 l Nährmedium (1 Fl. je Komponente für 0,5 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien besteht aus drei Komponenten. 1 Fl. pro Komponente in 0,5 l m-CP-Agar (Basis) TN1288.	4 x 3 Fl.
TN1188 TN1188-01	**Thioglycolat-Nährmedium nach EP/USP (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Wasser- und Abwasseruntersuchung

Keimzahlbestimmung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1124	**DEV Gelatine-Agar**	für 11,1 l Nährmedium (45,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1724	**DEV Nähragar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1128 TN1128-01	**DEV Nähragar**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1164 TN1164-01	**Nähragar I**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben. für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben.	500 g 5 kg
TN1189	**Plate-Count-Agar (TGE-Agar, Trypton-Glucose-Hefeextrakt-Agar)**	für 27,0 l Nährmedium (18,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

E. coli und coliforme Keime

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1109	**Brillantgrün-Galle-Lactose-Bouillon (BRILA-Bouillon)**	für 12,5 l Nährmedium: einfachkonzentriert (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 6,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (80,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1127 TN1227-01	**DEV Lactose-Pepton-Bouillon**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1152	**Laurylsulfat-Bouillon (Laurylsulfat-Tryptose-Lactose-Bouillon)**	für 14,0 l Nährmedium (35,6 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1153	**Laurylsulfat-Tryptose-Bouillon mit Tryptophan und MUG (LST/MUG-Nährmedium)**	für 13,6 l Nährmedium: einfachkonztriert (36,7 g für 1 l Nährmedium) für 6,8 l Nährmedium: doppeltkonztriert (73,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Isolierung

TN1130	**Endo-Agar (Lactose-Fuchsin-Sulfit-Agar)**	für 14,5 l Nährmedium (34,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1156	**MacConkey-Agar**	für 10,3 l Nährmedium (48,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1075 TN1075-01	**MacConkey-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium) für 100,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1148	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1149	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose-Agar (VRB-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Bestätigung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1517	**Oxidase-Reagenz**	für 12 Anwendungen: 1 Fl. in 2 ml Aqua dest. lösen.	12 x 1 Fl.
TN1258	**Tryptophan-Peptonwasser (Tryptophan-B.)**	für 6,3 l Nährmedium (16,0 g für 1 l Nährmedium)	100 g

Fäkalstreptokokken

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1103	**Azid-Glucose-Bouillon**	für 14,3 l Nährmedium: einfachkonzentriert (35,0 g für 1 l Medium) für 7,4 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (70,0 g für 1 l Medium)	500 g
TN1218	**Kanamycin-Äsculin-Azid-Bouillon (KAA-Bouillon)**	für 15,3 l Nährmedium (32,7 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Isolierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1132	**Enterokokken-Selektiv-Agar nach Slanetz-Bartley (m-Enterokokkus-Agar)**	für 12,0 l Nährmedium (41,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1217	**Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar (KAA-Agar)**	für 11,7 l Nährmedium (42,7 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Bestätigung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1276	**Galle-Äsculin-Azid-Agar (GÄA-Agar)**	für 9,3 l Nährmedium (53,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Pseudomonas aeruginosa

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1158	**Malachitgrün-Bouillon**	für 56,8 l Nährmedium (8,8 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Isolierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286	100 ml
TN1517	**Oxidase-Reagenz**	für 12 Anwendungen 1 Fl. in 2 ml Aqua dest. lösen.	12 x 1 Fl.
TN1286	**Pseudomonas-Agar (Basis)**	für 10,3 l Nährmedium (48,4 g für 1 l Nährmedium) Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement TN1323 und Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1323	**Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286.	12 x 1 Fl.

Sulfitreduzierende, sporenbildende Anaerobier

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1116	**Clostridien-Differential-Bouillon (DRCM)**	für 16,6 l Nährmedium: einfachkonzentriert (30,1 g für 1 l Nährmedium) für 8,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (60,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1167	**Clostridien-Medium nach harm. EP/USP/JP (RCM)**	für 13,2 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Bestätigung

TN1288	**m-CP-Agar(Basis)(ChromogenerMembran-filtrations-Clostridium perfringens-Agar)**	für 7,3 l Nährmedium (68,2 g für 1 l Nährmedium) m-CP-Selektiv-Supplement TN 1330 zugeben.	500 g
TN1188 TN1188-01	**Thioglycolat-Nährmedium nach EP/USP (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Staphylococcus aureus

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1263 TN1263-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Isolierung

TN1104	**Baird-Parker-Agar (Basis)**	für 7,9 l Nährmedium (63,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Kaliumtellurit TN1310 zugeben.	500 g
TN1310	**Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion**	für ca. 2 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Baird-Parker-Agar (Basis) TN1104.	4 x 25 ml
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Untersuchung von Trinkwasser

E. coli und coliforme Keime

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1064	**ChroMedium Coliforme (Chromogener Coliformen Agar, CCA)**	für 17,3 l Nährmedium (28,9 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar nach harm. EP/USP/JP (CASO-Agar nach harm. EP/USP/JP)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1724	**DEV Nähragar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1128 TN1128-01	**DEV Nähragar**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1164 TN1164-01	**Nähragar I**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben. für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben.	500 g 5 kg
TN1517	**Oxidase-Reagenz**	für 12 Anwendungen, 1 Fl. in 2 ml Aqua dest. lösen.	12 x 1 Fl.
TN1258	**Tryptophan-Peptonwasser (Tryptophan-Bouillon)**	für 6,3 l Nährmedium (16,0 g für 1 l Nährmedium)	100 g

Enterokokken

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1132	**Enterokokken-Selektiv-Agar nach Slanetz-Bartley (m-Enterokokkus-Agar)**	für 12,0 l Nährmedium (41,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1276	**Galle-Äsculin-Azid-Agar (GÄA-Agar)**	für 9,3 l Nährmedium (53,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Clostridien

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1288	**m-CP-Agar (Basis) (Chromogener Membranfiltrations-Clostridium perfringens-Agar)**	für 7,3 l Nährmedium (68,2 g für 1 l Nährmedium) m-CP-Selektiv-Supplement TN1330 zugeben.	500 g
TN1330	**m-CP-Selektiv-Supplement**	für 2 l Nährmedium (1 Fl. je Komponente für 0,5 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien besteht aus drei Komponenten. 1 Fl. pro Komponente in 0,5 l m-CP-Agar (Basis) TN1288.	4 x 3 Fl.
TN1519	**Saure Phosphatase Reagenz**	6 Vials Farbreagenz, 1 Fl. Puffer	6 Vials + 1 Fl.
TN1241	**TSC-Agar (Basis) (Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar)**	für 12,8 l Nährmedium (39,0 g für 1 l Nährmedium) TSC-Selektiv-Supplement TN1333 zugeben.	500 g
TN1268	**TSC-Agar (Basis) nach ISO 15213-1 (Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar nach ISO)**	für 13,1 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium) TSC-Selektiv-Supplement TN1333 zugeben.	500 g
TN1333	**TSC-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l TSC-Agar (Basis) TN1241.	12 x 1 Fl.

Pseudomonaden

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1512 TN1512-01	**Acetamid-Lösung**	für 20 Anwendungen für 100 Anwendungen Gebrauchsfertige Acetamid-Lösung ist zusammengesetzt nach DIN EN ISO 16266. 1 Röhrchen enthält 5 ml Acetamid-Lösung. Neßlers Reagenz TN1515, TN1516 zugeben.	20 x 1 R. 100 x 1 R.
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: King's B-Agar (Basis) nach EN 12780 TN1287 Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286	100 ml
TN1287	**King's B-Agar (Basis)**	für 2,7 l Nährmedium (36,9 g für 1 l Nährmedium) Glycerin TN 1424 zugeben.	100 g
TN1515 TN1515-01	**Neßlers Reagenz**	für 60 Röhrchen Acetamid-Lösung für 480 Röhrchen Acetamid-Lösung Mit Acetamid-Lösung TN1512, TN1513.	1 x 5 ml 4 x 10 ml
TN1517	**Oxidase-Reagenz**	für 12 Anwendungen 1 Fl. in 2 ml Aqua dest. lösen.	12 x 1 Fl.
TN1286	**Pseudomonas-Agar (Basis)**	für 10,3 l Nährmedium (48,4 g für 1 l Nährmedium) Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement TN1323 und Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1323	**Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286.	12 x 1 Fl.

Gesamtkeimzahl

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1724	**DEV Nähragar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1128 TN1128-01	**DEV Nähragar**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1290	**Hefeextrakt-Agar**	für 26,3 l Nährmedium (19,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Untersuchung von Lebensmitteln

Keimzahlbestimmung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1164 TN1164-01	**Nähragar I**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben.	500 g 5 kg
TN1189	**Plate-Count-Agar (TGE-Agar, Trypton-Glucose-Hefeextrakt-Agar)**	für 27,0 l Nährmedium (18,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Enterobacterales

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1137 TN1137-01	**Gepuffertes Peptonwasser**	für 25,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium) für 250,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Isolierung

TN1086	**Glucose-Agar**	für 13,0 l Nährmedium (38,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1148	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1194 TN1194-01	**Wasserblau-Metachromgelb-Agar nach Gassner, modifiziert (Gassner-Agar, mod.)**	für 9,9 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium) für 99,4 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Bestätigung

TN1146	**Kligler-Eisen-Agar (KIA, Eisen-Zweizucker-Agar nach Kligler)**	für 10,1 l Nährmedium (49,6 g für 1 l Nährmedium) Harnstoff TN 1308 ggf. zugeben.	500 g
TN1156	**MacConkey-Agar**	für 10,3 l Nährmedium (48,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1075 TN1075-01	**MacConkey-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium) für 100,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1184	**Simmons-Citrat-Agar**	für 9,8 l Nährmedium (15,3 g für 1 l Nährmedium)	150 g

E. coli

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1109	**Brillantgrün-Galle-Lactose-Bouillon (BRILA-Bouillon)**	für 12,5 l Nährmedium: einfachkonzentriert (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 6,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (80,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1152	**Laurylsulfat-Bouillon (Laurylsulfat-Tryptose-Lactose-Bouillon)**	für 14,0 l Nährmedium (35,6 g für 1 l Nährmedium	500 g
TN1153	**Laurylsulfat-Tryptose-Bouillon mit Tryptophan und MUG (LST/MUG-Nährmedium)**	für 13,6 l Nährmedium: einfachkonztriert (36,7 g für 1 l Nährmedium) für 6,8 l Nährmedium: doppeltkonztriert (73,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Isolierung

TN1130	**Endo-Agar (Lactose-Fuchsin-Sulfit-Agar)**	für 14,5 l Nährmedium (34,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1259	**TBX-Chromogen-Agar (Trypton-Galle-X-Glucuronid-Agar)**	für 15,8 l Nährmedium (31,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1148	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1149	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Lactose-Agar (VRB-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Salmonellen

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1013	**DIASSALM (Diagnostic Semi-Solid Salmonella Agar)**	für 8,7 l Nährmedium (57,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1137 TN1137-01	**Gepuffertes Peptonwasser**	für 25,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium) für 250,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1157	**Magnesiumchlorid-Malachitgrün-Bouillon nach Rappaport und Vassiliadis (RV-Medium)**	für 15,0 l Nährmedium (33,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1262	**Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon nach harm. EP/USP/JP (RVS Bouillon)**	für 18,5 l Nährmedium (27,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1183	**Selenit-Cystin-Bouillon**	für 21,7 l Nährmedium (23,0 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1187	**Tetrathionat-Bouillon (Basis) nach Muller-Kauffmann**	für 5,0 l Nährmedium (89,4 g für 1 l Nährmedium) Jod-Kaliumjodid-Lösung (5 g Kaliumjodid, 4 g Jod, 20 ml Aqua dest.) zugeben.	500 g

Isolierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1110	**Brillantgrün-Phenolrot-Agar nach Edel und Kampelmacher (BPLS-Agar, mod.)**	für 10,1 l Nährmedium (49,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1121	**Desoxycholat-Citrat-Agar, modifiziert (Leifson-Agar, DCLS-Agar, modifiziert)**	für 10,1 l Nährmedium (49,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1221 TN1221-01	**Salmonella-Shigella-Agar, modifiziert (SS-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium) für 88,5 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1170	**XLD-Agar nach harm. EP/USP/JP (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 9,1 l Nährmedium (55,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1196	**XLD-Agar nach ISO 6579 (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (57,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Bestätigung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1308	**Harnstoff-Lösung, 40%**	Zusatz für Nährmedien: 1 Fl. in 1 l Kligler-Eisen-Agar TN 1146.	12 x 1 Fl.
TN1146	**Kligler-Eisen-Agar (KIA, Eisen-Zweizucker-Agar nach Kligler)**	für 10,1 l Nährmedium (49,6 g für 1 l Nährmedium) Harnstoff-Lösung TN1308 ggf. zugeben.	500 g
TN1154	**Lysindecarboxylase-Bouillon (LDC-Bouillon)**	für 5,5 l Nährmedium (9,0 g für 1 l Nährmedium)	50 g
TN1272	**MSRV-Nährboden (Basis) (Modified-Semisolid-Rappaport-Vassiliadis-Medium)**	für 15,8 l Nährmedium (31,6 g für 1 l Nährmedium) Novobiocin-Selektiv-Supplement TN1324 zugeben.	500 g
TN1324	**Novobiocin-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l MSRV-Nährboden (Basis) TN1272.	12 x 1 Fl.

Koagulase-positive Staphylokokken

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1083 TN1083-01	**CASO-Bouillon, strahlensterilisiert (Sojapepton-Caseinpepton-Bouillon, strahlensterilisiert)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Isolierung

TN1104	**Baird-Parker-Agar (Basis)**	für 7,9 l Nährmedium (63,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Kaliumtellurit TN1310 zugeben.	500 g
TN1310	**Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion**	für ca. 2 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Baird-Parker-Agar (Basis) TN1104.	4 x 25 ml
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Pseudomonas aeruginosa

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1158	**Malachitgrün-Bouillon**	für 56,8 l Nährmedium (8,8 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Isolierung

TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286	100 ml
TN1517	**Oxidase-Reagenz**	für 12 Anwendungen 1 Fl. in 2 ml Aqua dest. lösen.	12 x 1 Fl.
TN1286	**Pseudomonas-Agar (Basis)**	für 10,3 l Nährmedium (48,4 g für 1 l Nährmedium) Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement TN1323 und Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1323	**Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286.	12 x 1 Fl.

Lactobacillen

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1201	**MRS-Agar (Basis) (Lactobacillus-Agar nach de Man, Rogosa und Sharpe)**	für 8,0 l Nährmedium (62,3 g für 1 l Nährmedium) Tween® 80 TN1422 zugeben.	500 g
TN1068	**MRS-Agar (Basis) mit pH 5,7**	für 7,8 l Nährmedium (64,3 g für 1 l Nährmedium) Tween® 80 TN1422 zugeben.	500 g
TN1205	**MRS-Bouillon (Basis)**	für 9,7 l Nährmedium (51,3 g für 1 l Nährmedium) Tween® 80 TN1422 zugeben.	500 g
TN1422	**Tween® 80**	1 ml in 1 l MRS-Agar (Basis) TN1201. 1 ml in 1 l MRS-Agar (Basis) mit pH 5,7 TN1068. 1 ml in 1 l MRS-Bouillon (Basis) TN1205.	100 ml

Hefen und Schimmelpilze

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Würze-Agar (Basis) TN1210	100 ml
TN1264	**Sabouraud-Dextrose-Agar harm. EP/USP/JP**	für 7,7 l Nährmedium (65,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1178 TN1178-01	**Sabouraud-2%Glucose-Agar (Sabouraud-Dextrose-Agar)**	für 11,9 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium) für 119,0 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1746	**Würze-Agar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1210	**Würze-Agar (Basis)**	für 10,4 l Nährmedium (48,0 g für 1 l Nährmedium) Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1144	**YGC-Agar (Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar)**	für 14,2 l Nährmedium (35,1 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Clostridien

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1116	**Clostridien-Differential-Bouillon (DRCM)**	für 16,6 l Nährmedium: einfachkonzentriert (30,1 g für 1 l Nährmedium) für 8,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (60,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1167	**Clostridien-Medium nach harm. EP/USP/JP (RCM)**	für 13,2 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Mesophile Sporenbildner

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar (CASO-Agar) nach harm. EP/USP/JP**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Untersuchung von Fleisch und Fleischprodukten

Keimzahlbestimmung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1164 TN1164-01	**Nähragar I**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben.	500 g 5 kg
TN1189	**Plate-Count-Agar (TGE-Agar, Trypton-Glucose-Hefeextrakt-Agar)**	für 27,0 l Nährmedium (18,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Enterobacterales

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1137 TN1137-01	**Gepuffertes Peptonwasser**	für 25,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium) für 250,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Isolierung

TN1086	**Glucose-Agar**	für 13,0 l Nährmedium (38,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1156	**MacConkey-Agar**	für 10,3 l Nährmedium (48,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1075 TN1075-01	**MacConkey-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium) für 100,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1148	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1194 TN1194-01	**Wasserblau-Metachromgelb-Agar nach Gassner, modifiziert (Gassner-Agar, modifiziert)**	für 9,9 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium) für 99,4 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Bestätigung

TN1146	**Kligler-Eisen-Agar (KIA, Eisen-Zweizucker-Agar nach Kligler)**	für 10,1 l Nährmedium (49,6 g für 1 l Nährmedium) Harnstoff TN 1308 ggf. zugeben.	500 g
TN1184	**Simmons-Citrat-Agar**	für 9,8 l Nährmedium (15,3 g für 1 l Nährmedium)	150 g

Salmonellen

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1137 TN1137-01	**Gepuffertes Peptonwasser**	für 25,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium) für 250,0 l Nährmedium (20,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Anreicherung

TN1157	**Magnesiumchlorid-Malachitgrün-Bouillon nach Rappaport und Vassiliadis (RV-Medium)**	für 15,0 l Nährmedium (33,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1262	**Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon nach harm. EP/USP/JP (RVS Bouillon)**	für 18,5 l Nährmedium (27,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1183	**Selenit-Cystin-Bouillon**	für 21,7 l Nährmedium (23,0 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1187	**Tetrathionat-Bouillon (Basis) nach Muller-Kauffmann**	für 5,0 l Nährmedium (89,4 g für 1 l Nährmedium) Jod-Kaliumjodid-Lösung (5 g Kaliumjodid, 4 g Jod, 20 ml Aqua dest.) zugeben.	500 g

Isolierung

TN1111	**Brillantgrün-Phenolrot-Agar (BPLS-Agar nach Kauffmann, modifiziert)**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1110	**Brillantgrün-Phenolrot-Agar nach Edel und Kampelmacher (BPLS-Agar, mod.)**	für 10,1 l Nährmedium (49,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1121	**Desoxycholat-Citrat-Agar, modifiziert (Leifson-Agar, DCLS-Agar, modifiziert)**	für 10,1 l Nährmedium (49,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1221 TN1221-01	**Salmonella-Shigella-Agar, modifiziert (SS-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium) für 88,5 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1194 TN1194-01	**Wasserblau-Metachromgelb-Agar nach Gassner, modifiziert (Gassner-Agar, modifiziert)**	für 9,9 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium) für 99,4 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1170	**XLD-Agar nach harm. EP/USP/JP (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 9,1 l Nährmedium (55,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1196	**XLD-Agar nach ISO 6579 (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (57,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Bestätigung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1308	**Harnstoff-Lösung, 40%**	Zusatz für Nährmedien: 1 Fl. in 1 l Kligler-Eisen-Agar TN 1146.	12 x 1 Fl.
TN1146	**Kligler-Eisen-Agar (KIA, Eisen-Zweizucker-Agar nach Kligler)**	für 10,1 l Nährmedium (49,6 g für 1 l Nährmedium) Harnstoff TN1308 ggf. zugeben.	500 g
TN1154	**Lysindecarboxylase-Bouillon (LDC-Bouillon)**	für 5,5 l Nährmedium (9,0 g für 1 l Nährmedium)	50 g
TN1272	**MSRV-Nährboden (Basis) (Modified-Semisolid-Rappaport-Vassiliadis-Medium)**	für 15,8 l Nährmedium (31,7 g für 1 l Nährmedium) Novobiocin-Selektiv-Supplement TN1324 zugeben.	500 g
TN1324	**Novobiocin-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l MSRV-Nährboden (Basis) TN1272.	12 x 1 Fl.

Koagulase-positive Staphylokokken

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1083 TN1083-01	**CASO-Bouillon, strahlensterilisiert (Sojapepton-Caseinpepton-Bouillon, strahlensterilisiert)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Isolierung

TN1104	**Baird-Parker-Agar (Basis)**	für 7,9 l Nährmedium (63,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Kaliumtellurit TN1310 zugeben.	500 g
TN1310	**Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion**	für ca. 2 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Baird-Parker-Agar (Basis) TN1104.	4 x 25 ml
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Listerien

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1257	**Fraser-Bouillon (Basis)**	für 8,7 l Nährmedium (57,4 g für 1 l Nährmedium) Fraser-Selektiv-Supplement TN1318 zugeben.	500 g
TN1035	**Fraser-Bouillon, komplett**	für 8,6 l Nährmedium (57,9 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1034 TN1034-01	**Fraser-Bouillon - halbkonzentriert, komplett**	für 8,6 l Nährmedium (57,9 g für 1 l Nährmedium) für 86,3 l Nährmedium (57,9 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g 5 kg
TN1318	**Fraser-Selektiv-Supplement**	für 3 l Nährmedium (1 Fl. je Komponente für 0,5 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien besteht aus zwei Komponenten. 1 Fl. pro Komponente in 0,5 l Fraser-Bouillon (Basis) TN1257.	6 x 2 Fl.
TN1209	**Palcam-Agar (Basis)** **(Palcam-Agar nach van Netten)**	für 7,4 l Nährmedium (68,0 g für 1 l Nährmedium) Palcam-Selektiv-Supplement TN1312 zugeben.	500 g
TN1312	**Palcam-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Palcam-Agar (Basis) TN1209.	12 x 1 Fl.

Bacillus cereus

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1245	**Bacillus-Cereus-Agar (Basis) (PEMBA)**	für 12,5 l Nährmedium (39,9 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Emulsion TN1316 und Bacillus-Cereus-Selektiv-Supplement TN1315 zugeben.	500 g
TN1315	**Bacillus-Cereus-Selektiv-Supplement** **(Polymyxin B-Selektiv-Supplement)**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Mit Bacillus-Cereus-Agar (Basis) TN 1245 und Eigelb-Emulsion TN1316.	12 x 1 Fl.
TN1316	**Eigelb-Emulsion**	für ca. 1-2 l Nährmedium (2-4 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Bacillus-Cereus-Agar (Basis) TN1245. 4 Fl. in 900 ml MYP-Agar (Basis) TN1291.	4 x 25 ml
TN1291	**MYP-Agar (Basis)** **(Cereus-Selektivagar nach Mossel)**	für 11,6 l Nährmedium (43,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Emulsion TN1316 und Bacillus-Cereus-Selektiv-Supplement TN1315 zugeben.	500 g

Untersuchungen in der Getränkeindustrie

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1724	**DEV-Nähragar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1128 TN1228-01	**DEV-Nähragar**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium) für 142,9 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Würze-Agar (Basis) TN1210	100 ml
TN1066	**Linden-Grain-Medium**	für 847,5 l Nährmedium (29,5 g für 1 l Nährmedium)	25 kg
TN1743	**Lysin-Agar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1707 TN1707-01	**MegaPec-Bouillon**	1 Röhrchen enthält 12 ml Bouillon. 1 Röhrchen enthält 12 ml Bouillon.	20 R. 100 R.
TN1201	**MRS-Agar (Basis) (Lactobacillus-Agar nach de Man, Rogosa und Sharpe)**	für 8,0 l Nährmedium (62,3 g für 1 l Nährmedium) Tween® 80 TN1422 zugeben.	500 g
TN1207	**Orangenserum-Agar**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1269	**Orangenserum-Bouillon**	für 20,0 l Nährmedium (25,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1502	**VLB-S7-S-Agar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1503	**VLB-S7-S-Bouillon**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1744	**WL-Nähragar (WLN)**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1745	**WL-Nähragar mit Cycloheximid (WLD)**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1746	**Würze-Agar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1210	**Würze-Agar (Basis)**	für 10,4 l Nährmedium (48,0 g für 1 l Nährmedium) Glycerin TN1424 zugeben.	500 g

diagnostics
with passion



Nährmedien für die Getränkeindustrie

Mikrobiologie
Fertignährmedien
Trockennährmedien

Mehr Sicherheit in der Getränkeproduktion

- Optimal gerüstet für die Qualitätskontrolle in der Getränkeproduktion
- Zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiologischen Untersuchung von alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken
- Nährmedien für die gezielte Vermehrung besonders anspuchsvoller Spezies
- Fertignährmedien in Röhrchen und Flaschen oder als Trockennährmedien erhältlich

Haben Sie spezielle Anforderungen?

Wir entwickeln und produzieren nach Ihren Wünschen.



sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de

Nachweis anaerober Mikroorganismen

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar nach harm. EP/USP/JP (CASO-Agar nach harm. EP/USP/JP)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmediummedium)	500 g 5 kg
TN1116	**Clostridien-Differential-Bouillon (DRCM)**	für 16,6 l Nährmedium: einfachkonzentriert (30,1 g für 1 l Medium) für 8,3 l Nährmedium: doppeltkonzentriert (60,2 g für 1 l Medium)	500 g
TN1167	**Clostridien-Medium nach harm. EP/USP/JP (RCM)**	für 13,2 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1139	**Glucose-Hefeextrakt-Cystein-Agar (Basis) nach Beerens**	für 13,8 l Nährmedium (36,3 g für 1 l Nährmedium) Blutzusatz erforderlich.	500 g
TN1288	**m-CP-Agar (Basis) (Chromogener Membranfiltrations-Clostridium perfringens-Agar)**	für 7,3 l Nährmedium (68,2 g für 1 l Nährmedium) m-CP-Selektiv-Supplement TN1330 zugeben.	500 g
TN1330	**m-CP-Selektiv-Supplement**	für 2 l Nährmedium (1 Fl. je Komponente für 0,5 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien besteht aus drei Komponenten. 1 Fl. pro Komponente in 0,5 l m-CP-Agar (Basis) TN1288.	4 x 3 Fl.
TN1203	**Schaedler-Bouillon**	für 19,1 l Nährmedium (26,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1188 TN1188-01	**Thioglycolat-Nährmedium nach EP/USP (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1256	**Thioglycolat-Nährmedium, modifiziert (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1023	**Thioglycolat-Medium ohne Indikator**	für 16,6 l Nährmedium (30,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1241	**TSC-Agar (Basis) (Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar)**	für 12,8 l Nährmedium (39,0 g für 1 l Nährmedium) TSC-Selektiv-Supplement TN1333 zugeben.	500 g
TN1268	**TSC-Agar (Basis) nach ISO 15213-1 (Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar nach ISO)**	für 13,1 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium) TSC-Selektiv-Supplement TN1333 zugeben.	500 g
TN1333	**TSC-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l TSC-Agar (Basis) TN1241.	12 x 1 Fl.

Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1263 TN1263-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Würze-Agar (Basis) TN1210	100 ml
TN1150	**Kartoffel-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 12,8 l Nährmedium (39,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1264	**Sabouraud-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 7,7 l Nährmedium (65,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1047	**Sabouraud-Dextrose-Bouillon nach harm. EP/USP/JP**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1178 TN1178-01	**Sabouraud-2%Glucose-Agar (Sabouraud-Dextrose-Agar)**	für 11,9 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium) für 119,0 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1015	**Sabouraud-Glucose-Medium mit Chloramphenicol**	für 8,1 l Nährmedium (62,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1210	**Würze-Agar (Basis)**	für 10,4 l Nährmedium (48,0 g für 1 l Nährmedium) Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1144	**YGC-Agar (Hefeextrakt-Glucose-Chloramphenicol-Agar)**	für 14,2 l Nährmedium (35,1 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g

Biochemische Identifizierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1308	**Harnstoff-Lösung, 40%**	Zusatz für Nährmedien: 1 Fl. in 1 l Kligler-Eisen-Agar TN1146.	12 x 1 Fl.
TN1146	**Kligler-Eisen-Agar (KIA, Eisen-Zweizucker-Agar nach Kligler)**	für 10,1 l Nährmedium (49,6 g für 1 l Nährmedium) Harnstoff-Lösung TN1308 ggf. zugeben.	500 g
TN1154	**Lysindecarboxylase-Bouillon (LDC-Bouillon)**	für 5,5 l Nährmedium (9,0 g für 1 l Nährmedium)	50 g
TN1184	**Simmons-Citrat-Agar**	für 9,8 l Nährmedium (15,3 g für 1 l Nährmedium)	150 g

Unser Portfolio geht weiter – gerne auf Anfrage.

Nährmedien für die Pharmaindustrie

MIKROBIOLOGIE



Unsere Nährmedien bekommen Sie bei uns rezeptfrei

Inhalt

- *Escherichia coli*
- Salmonellen
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staphylococcus aureus*
- Clostridien
- *Candida albicans*
- Zählung von Mikroorganismen
- Galle-tolerante gram-negative Bakterien
- Dermatophyten



Escherichia coli

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1263	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1263-01		für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	5 kg

Isolierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1075	**MacConkey-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1075-01		für 100,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	5 kg
TN1027	**MacConkey-Bouillon nach harm. EP/USP/JP**	für 14,3 l Nährmedium (35,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Salmonellen

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1263	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1263-01		für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	5 kg

Selektive Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1262	**Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon nach harm. EP/USP/JP (RVS Bouillon)**	für 18,5 l Nährmedium (27,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Isolierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1170	**XLD-Agar nach harm. EP/USP/JP (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 9,1 l Nährmedium (55,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Pseudomonas aeruginosa

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1263	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1263-01		für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	5 kg

Staphylococcus aureus

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1263	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1263-01		für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	5 kg

Selektive Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Clostridien

Selektive Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1167	**Clostridien-Medium nach harm. EP/USP/JP (RCM)**	für 13,2 l Nährmedium (38,0 g für 1 l Nährmedium) Blut ggf. zugeben.	500 g

Isolierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1118	**Columbia-Agar (Basis) (Columbia-Blutagar-Basis)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) Blut zugeben.	500 g
TN1191	**Columbia-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 12,2 l Nährmedium (41,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Candida albicans

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1047	**Sabouraud-Dextrose-Bouillon nach harm. EP/USP/JP**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Selektive Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1264	**Sabouraud-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 7,7 l Nährmedium (65,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1178	**Sabouraud-2%Glucose-Agar (Sabouraud-Dextrose-Agar)**	für 11,9 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1178-01		für 119,0 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	5 kg

Zählung von Mikroorganismen

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar nach harm. EP/USP/JP (CASO-Agar nach harm. EP/USP/JP)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1263 TN1263-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1150	**Kartoffel-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 12,8 l Nährmedium (39,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1025 TN1025-01	**Natriumchlorid-Pepton-Pufferlösung pH 7,0 nach harm. EP/USP/JP**	für 34,2 l Nährmedium (14,6 g für 1 l Nährmedium) für 342.4 l Nährmedium (14,6 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1264	**Sabouraud-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 7,7 l Nährmedium (65,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Galle-tolerante gram-negative Bakterien

Voranreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1263 TN1263-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon nach harm. EP/USP/JP (CASO-Bouillon nach harm. EP/USP/JP)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Anreicherung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1236	**Enterobacteriaceae-Anreicherungsbouillon Mossel nach harm. EP/USP/JP**	für 11,5 l Nährmedium (43,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Isolierung

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Dermatophyten

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN2102	**Dermatophyten-Agar, modifiziert**	Enthält Chloramphenicol und Cycloheximid. Keine Zusätze erforderlich.	2 x 10 FP
TN1178 TN1178-01	**Sabouraud-2%Glucose-Agar (Sabouraud-Dextrose-Agar)**	für 11,9 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium) für 119,0 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1016	**Sabouraud-2%Glucose-Chloramphenicol-Agar**	für 11,9 l Nährmedium (42,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Nährmedien für die Kosmetikindustrie

MIKROBIOLOGIE



... wahre Schönheit kommt von innen

Inhalt

- *Escherichia coli*
- Mesophile Sporenbildner
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staphylococcus aureus*



E. coli

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar nach harm. EP/USP/JP (CASO-Agar nach harm. EP/USP/JP)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1147	**Kochsalz-Peptonlösung (Peptonsalz-Lösung, Maximale Wiederbelebungslösung)**	für 52,6 l Nährmedium (9,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1156	**MacConkey-Agar**	für 10,3 l Nährmedium (48,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1075 TN1075-01	**MacConkey-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 10,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium) für 100,0 l Nährmedium (50,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Mesophile Sporenbildner

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar nach harm. EP/USP/JP (CASO-Agar nach harm. EP/USP/JP)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1147	**Kochsalz-Peptonlösung (Peptonsalz-Lösung, Maximale Wiederbelebungslösung)**	für 52,6 l Nährmedium (9,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1025 TN1025-01	**Natriumchlorid-Pepton-Pufferlösung pH 7,0 nach harm. EP/USP/JP**	für 34,2 l Nährmedium (14,6 g für 1 l Nährmedium) für 342,4 l Nährmedium (14,6 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Pseudomonas aeruginosa

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar nach harm. EP/USP/JP (CASO-Agar nach harm. EP/USP/JP)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1147	**Kochsalz-Peptonlösung (Peptonsalz-Lösung, Maximale Wiederbelebungslösung)**	für 52,6 l Nährmedium (9,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Staphylococcus aureus

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1104	**Baird-Parker-Agar (Basis)**	für 7,9 l Nährmedium (63,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Kaliumtellurit TN1310 zugeben.	500 g
TN1031 TN1031-01	**Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar nach harm. EP/USP/JP (CASO-Agar nach harm. EP/USP/JP)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) für 125,0 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1310	**Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion**	für ca. 2 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Baird-Parker-Agar (Basis) TN1104.	4 x 25 ml
TN1147	**Kochsalz-Peptonlösung (Peptonsalz-Lösung, Maximale Wiederbelebungslösung)**	für 52,6 l Nährmedium (9,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Nährmedien für die Veterinärmedizin

MIKROBIOLOGIE



Ohne Diagnostik kommen Sie nicht ungeschoren davon

Inhalt

- *Enterobacterales*
- Pilze
- Universalnährmedien
- Pseudomonaden
- *Salmonella* und *Shigella*
- Staphylokokken
- Streptokokken



Enterobacterales

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1110	**Brillantgrün-Phenolrot-Agar nach Edel und Kampelmacher (BPLS-Agar, mod.)**	für 10,1 l Nährmedium (49,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1121	**Desoxycholat-Citrat-Agar, modifiziert (Leifson-Agar, DCLS-Agar, modifiziert)**	für 10,1 l Nährmedium (49,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1130	**Endo-Agar (Lactose-Fuchsin-Sulfit-Agar)**	für 14,5 l Nährmedium (34,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1148	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1157	**Magnesiumchlorid-Malachitgrün-Bouillon nach Rappaport und Vassiliadis (RV-Medium)**	für 15,0 l Nährmedium (33,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1040	**Minca-Agar, modifiziert**	für 18,9 l Nährmedium (26,4 g für 1 l Nährmedium) Minca-Supplement TN 1334 zugeben.	500 g
TN1334	**Minca-Supplement**	für 1,2 l Nährmedium (1 Fl. für 0,1 l Nährmedium) 1 Fl. in 100 ml Minca-Agar, modifiziert TN1040.	12 x 1 Fl.
TN1262	**Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon nach harm. EP/USP/JP (RVS Bouillon)**	für 18,5 l Nährmedium (27,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1221 TN1221-01	**Salmonella-Shigella-Agar, modifiziert (SS-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium) für 88,5 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1194 TN1194-01	**Wasserblau-Metachromgelb-Agar nach Gassner, modifiziert (Gassner-Agar, mod.)**	für 9,9 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium) für 99,4 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Salmonellen und Shigellen

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1170	**XLD-Agar nach harm. EP/USP/JP (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 9,1 l Nährmedium (55,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1196	**XLD-Agar nach ISO 6579 (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (57,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Pilze

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Würze-Agar (Basis) TN1210	100 ml
TN1308	**Harnstoff-Lösung, 40%**	Zusatz für Nährmedien.	12 x 1 vial
TN1264	**Sabouraud-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 7,7 l Nährmedium (65,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1178 TN1178-01	**Sabouraud-2%Glucose-Agar (Sabouraud-Dextrose-Agar)**	für 11,9 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium) für 119,0 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1746	**Würze-Agar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1210	**Würze-Agar (Basis)**	für 10,4 l Nährmedium (48,0 g für 1 l Nährmedium) Glycerin TN1424 zugeben.	500 g

Universalnährmedien

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1216	**Hirn-Herz-Bouillon (BHI)**	für 13,5 l Nährmedium (37,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1188 TN1188-01	**Thioglycolat-Nährmedium nach EP/USP (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1256	**Thioglycolat-Nährmedium, modifiziert (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1023	**Thioglycolat-Medium ohne Indikator**	für 16,6 l Nährmedium (30,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Pseudomonaden

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286	100 ml
TN1286	**Pseudomonas-Agar (Basis)**	für 10,3 l Nährmedium (48,4 g für 1 l Nährmedium) Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement TN1323 und Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1323	**Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286.	12 x 1 vial

Staphylokokken

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1104	**Baird-Parker-Agar (Basis)**	für 7,9 l Nährmedium (63,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Kaliumtellurit TN1310 zugeben.	500 g
TN1310	**Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion**	für ca. 2 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Baird-Parker-Agar (Basis) TN1104.	4 x 25 ml
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Streptokokken

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1118	**Columbia-Agar (Basis) (Columbia-Blutagar-Basis)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) Blut zugeben.	500 g
TN1191	**Columbia-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 12,2 l Nährmedium (41,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Zertifikat

Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17025

Notizen

Sie haben Ihr Wunschprodukt noch nicht gefunden?

Es ist nur eine Frage entfernt: Schreiben
Sie uns einfach eine E-Mail an vertrieb@sifin.de.
Wir haben für Sie weitere Nährmedien auf Lager.

sifin

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 700 144-0
Telefax: +49 30 700 144-30
E-Mail: info@sifin.de

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 700 144-0
Telefax: +49 30 700 144-30
E-Mail: info@sifin.de

www.sifin.de